Lu 1°.
Lu 2°.

Observation sur ~~la~~ une matrice Schirreuse

~~dune dame morte agé de 74 ans~~

Avant dentrer dans le detail de la piece qui fait le sujet de cette observation, je pense quil est necessaire dexposer les faits suivents. la dame dont il est question, a lage de 21 ans etant alors fille, eut limprudence de se baigner dans une rivierre dont leau etoit tres froide; elle avoit alors ses regles et elles furent supprimées.

En 1714 cette demoiselle fut Mariée, son Mari ne recut quenviron neuf a di mois peut de tems apres sa Mort elle se plaignit dune grosseur dans le ventre, quetoit si Considerable, et si doulouREUse quon assura quelle ne pouvoit etre regardée comme grocesse. jignore si cette dame eut ses regles, depuis la supression occasionné par le bain jusqua son Mariage. cequi donne lieu de Croire quelles ne parurent point, cest que depuis ce tems, elle a toujours eut une Mauvaise santé; la thumeur augmentant de volume, les douleurs augmentoint aussi chaques jours

la Medecine mit en usage plusieurs remedes qui n'opérerent aucun effet

ARC 17 d.4 n°65

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ce fut envain qu'elles eût recours aux Eaux du mont d'or
et à celles de plombierres: ces dernieres resources ne furent
d'aucune efficacité. la Malade a traîné une vie
languissante jusqu'au commencement de janvier
1757. une apoplexie à terminé sa vie le 15 du meme mois.
le landemain je fis l'ouverture de son corps, pour
examiner la Nature de la tumeur, je reconnus
que c'etoit la Matrice et la singularité de sa maladie
me donna occassion de la presenter a l'academie.
Mrs Verdieret levret y furent nommés pour en
faire l'examen avec Moy.
On scait que la figure de la Matrice dans son
Etat Naturel, est a peut prest semblables a celles d'une poire
qui seroit applatie tant dans sa partie anterieure,
que dans la posterieure. Celle qui fait le sujet
de cette observation, est une Masse de figure indeterminée, parvenue accidentelement aux poids
d'environ six livres. nous y avons remarqués des
tumeurs qui par rapport a leur situation, leur
figure et leur Consistence peuvent etre partagées
en 3 classes differentes.
la premiere classe est celles qui etoient situes sous
la Membrane commune que le peritoine fournit a la
Matrice.

elles etoient lymphatiques et differoient entre elles
seulement en grosseur. les unes n'excedoient pas le
volume d'un Maron, et les autres approchoient assez
de celui d'un petit oeuf de poule. le plus grand nombre
de ces tumeurs etoit placées aux partie laterales et
inferieurs de la Matrice.
Dans la seconde classe nous comprendrons
celles qui étoient placées dans l'Epaisseur des
propres parois de la Matrice il y en avoit quatre
principales aux quels nous nous attachames
particulierement.
primo. la plus Considerable de toute étoit situeé au
fond de la Matrice du Côté gauche elle approchoit
assez de la grosseur et de la forme de la tête d'un enfant
nouveau né; elle etoit ossifiée dans la plus grande
partie de sa surface et dans l'interieur, elle etoit d'une
substence compacte et Elastique.
secundo. aux parties laterales et moyennes du Corps
de la Matrice se trouvoient placées deux tumeurs
assez semblables en tout, a la precedente, elles n'en
differoient qu'en ce qu'elles avoient acquis un degré
d'ossification plus Considerable dans toutes leurs
circonferences, et que leurs partiés interne ayant
plus de solidité etoient devenus aux toucher plus
Elastique.

No. 65.

Tertio la quatrieme et derniere thumeur de la seconde classe, etoit de la grosseur et de la figure d'une petite poire et se trouvoit placé au côté droit de l'orifice de la Matrice qu'elle poussoit du côté gauche du bassin quoiqu'il ait lieu de presumer qu'elle eût le meme principe que les trois thumeurs Precedentes, elle n'étoit cependant pas de même Consistence, n'ayant aucun point d'ossification.

Après avoir ouvert la Matrice suivant sa longeur dans sa partie Anterieure, nous avons trouvé une thumeur que nous rengerons sous la 3.e Classe. cette thumeur avoit la forme d'une petite poire applatie ayant la pointe en bas, elle se trouvoit attachée par une pédicule tres Courte et de quelques lignes de diametre, a la Paroix interne de la Matrice vers sa partie gauche et moyenne. la portion la plus inferieure de cette thumeur qui, comme les precedentes etoit a motié osseuse rempli ssoit exactement la Cavité de la Matrice et en bouchoit le Col.

Jeyré & Lequemen 1787.